

DE

## OregaPlus

tolle Verdauung

- ✓ mit echtem Oreganoöl
- ✓ mit Thymianöl
- ✓ hochkonzentriert

### Ergänzungsfuttermittel für Geflügel

**OregaPlus** versorgt die Hühner mit wichtigen sekundären Pflanzenstoffen und Ölen. Die Kombination aus Oregano und Thymian übt sich positiv auf das Gleichgewicht der Verdauung aus, was unter anderem an den Inhaltsstoffen Thymol und Carvacrol liegt, deren Eigenschaften aus der Literatur bekannt sind.

**Zusammensetzung:** Wasser, Traubenzucker, Fructose, Natriumbicarbonat

**Analytische Bestandteile:** Rohprotein 0,4 %, Rohfett 5,4 %, Rohfaser 0,2 %, Rohasche 1,4 %, Natrium 0,3 %, Methionin 0,0 %, Lysin 0,0 %, Feuchte 79,5 %

**Gehalt an Zusatzstoffen je 1.000 ml: Konservierungsstoffe:** Kaliumsorbat (1k202) 20.000 mg. **Aromastoffe:** Oreganoöl (CoE 317) 30.000 mg, Thymianöl (CoE 456) 5.000 mg.

### Fütterungsempfehlung:

1 Pumpstoß = ca. 1,8 ml

Präventiv: 3-4 x pro Woche, 2 Pumpstöße je 1000 ml Trinkwasser

Bei Belastungen: 10 Tage hintereinander, 2 Pumpstöße je 1000 ml Trinkwasser

**Auch für Küken geeignet.**

***Aufgrund des gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalts an Kaliumsorbat darf dieses Ergänzungsfuttermittel an Geflügel höchstens mit 10ml je Liter Trinkwasser verfüttert werden.***

**Lagerung:** Dicht verschlossen, kühl (<+25 °C.) und vor Licht geschützt.

**Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co. KG**

Kieler Straße 36a

25551 Hohenlockstedt

Tel. +49 4826 8610-0

Fax +49 4826 8610-10

[info@idaplus.de](mailto:info@idaplus.de)

**Zulassungsnummer: α DE SH 1 00023**



V8 09.23



V8 09.23

GB

## OregaPlus

### Great digestion

- ✓ With real oregano oil
- ✓ With thyme oil
- ✓ Highly concentrated

#### Feed supplement for poultry

**OregaPlus** supplies chickens with important secondary plant substances and oils. The combination of oregano and thyme exerts a positive effect on the digestive balance thanks to the ingredients thymol and carvacrol, whose properties are well-known from the literature.

**Composition:** Water, dextrose, fructose, sodium bicarbonate.

**Analytical constituents:** Crude protein 0.4 %, crude fat 5.4 %, crude fibre 0.2 %, crude ash 1.4 %, sodium 0.3 %, methionine 0.0 %, lysine 0.0 %, humidity 79.5 %.

**Content of additives per 1,000 ml: Preservatives:** Potassium sorbate (1k202) 20,000 mg.  
**Flavouring compounds:** Oregano oil (CoE 317) 30,000 mg, thyme oil (CoE 456) 5,000 mg.

#### Feeding recommendation:

1 pump shot = approx. 1.8 ml

Preventive: 3-4 x per week, 2 pump shots per 1000 ml drinking water.

In case of stress: 10 days in a row, 2 pump shots per 1000 ml drinking water.

**Also suitable for chicks.**

***Due to the higher content of potassium sorbate compared to complete feeds, this supplementary feed may be fed to poultry at a maximum of 10ml per litre of drinking water.***

**Storage:** Tightly closed, cool (<+25 °C.) and protected from light.



V8 09.23

FR

## **OregaPlus**

**excellente digestion**

- ✓ avec de la véritable huile d'origan
- ✓ avec de l'huile de thym
- ✓ hautement concentré

### **Complément alimentaire pour volailles**

**OregaPlus** fournit aux poules des substances végétales secondaires et des huiles essentielles. L'association de l'origan et du thym a un effet positif sur l'équilibre digestif, notamment grâce au thymol et au carvacrol, dont les propriétés sont connues dans la littérature.

**Composition:** De l'eau, dextrose, fructose, bicarbonate de sodium.

**Composants analytiques:** Protéines brutes 0,4 %, grasses brutes 5,4 %, fibres brutes 0,2 %, cendres brutes 1,4 %, sodium 0,3 %, méthionine 0,0 %, lysine 0,0 %, humidité 79,5 %.

**Teneur en additifs par 1.000 ml: Conservateurs:** Sorbate de potassium (1k202) 20.000 mg. **Substances aromatiques:** Huile d'origan (CoE 317) 30.000 mg, huile de thym (CoE 456) 5.000 mg.

### **Recommandation d'alimentation :**

1 coup de pompe = env. 1,8 ml

Préventif : 3-4 x par semaine, 2 coups de pompe pour 1000 ml d'eau de boisson.

En cas de stress : 10 jours de suite, 2 coups de pompe par 1000 ml d'eau de boisson.

### **Convient également aux poussins.**

***En raison de sa teneur en sorbate de potassium plus élevée que celle des aliments complets, cet aliment complémentaire ne doit pas être donné aux volailles à raison de plus de 10 ml par litre d'eau potable.***

**Stockage:** Fermé hermétiquement, au frais (<+25 °C.) et à l'abri de la lumière.